



الجامعة الملكية المغربية للفروسية  
Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres

**IMPORTANT**

Rabat, le 1<sup>er</sup> mars 2021

**A**

**l'attention des Présidents de clubs,  
Unités de cavalerie et cavaliers**

**Objet : Prévention contre la rhinopneumonie.**

Dans le cadre de la lutte contre la rhinopneumonie équine qui a engendré des mortalités de chevaux dans la région de Valence (ESP), la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres (FRMSE) invite les Présidents de clubs, Unités de cavalerie et cavaliers, de prendre attache avec leurs vétérinaires traitants et de respecter les recommandations portées dans la fiche d'information ci-jointe.

La FRMSE reste à votre disposition pour tout complément d'information.



**Badre FAKIR**  
Directeur Général  
F.R.M.S.E.

Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres  
B.P. 742 - Dar Es Salam - Rabat - Maroc

t +212 537 75 44 24  
+212 537 66 38 38  
f +212 537 75 47 38  
e contact@frmse.ma

www.frmse.ma



## FICHE D'INFORMATION

# Rhinopneumonie équine

La rhinopneumonie est une maladie infectieuse, contagieuse causée par deux herpès Virus: EHV-1 (équine herpès Virus-1) et EHV-4. Après infection, le virus persiste souvent dans l'organisme, sous forme latente et peut se réactiver pour provoquer à nouveau la maladie (60 à 70% des chevaux sont porteurs latents).

### TRANSMISSION

La transmission se fait par :

1. Les sécrétions respiratoires des chevaux atteints de la forme respiratoire ;
2. Le contact avec un avorton ou les sécrétions utérines correspondantes dans l'expression abortive.

### SYMPTOMES

Comme pour beaucoup d'infections virales, une augmentation de la température corporelle (pouvant atteindre 41°C) est le signe d'appel.

1. **Forme respiratoire (due à EHV-1 ou EHV-4)** : L'atteinte respiratoire est très semblable à la grippe. Les symptômes les plus courants sont: des écoulements nasaux (clairs à jaunâtres), la toux (non systématique), une baisse d'appétit, un œdème des membres et des signes de « fatigue » ;
2. **Forme abortive (due essentiellement à EHV-1)** : Un avortement intervient sans signes prémonitoires, le plus souvent en fin de gestation (entre le 9<sup>ème</sup> et le 11<sup>ème</sup> mois) ;
3. **Forme nerveuse (due essentiellement à EHV-1)** : La rhinopneumonie peut mener à une atteinte du système nerveux, avec comme conséquence, une ataxie de degrés variable pouvant évoluer en paralysie.

### DIAGNOSTIC

1. Technique de certitude : PCR (la recherche du virus par écouvillonnage) ;
2. Recherche d'anticorps à partir d'une prise de sang pour chevaux non vaccinés.

### PREVENTION

1. Eviter l'introduction de chevaux étrangers dans vos écuries ;
2. Respectez d'avantage les règles d'hygiène et renforcer les opérations de désinfections des écuries ;
3. Demander conseil à votre vétérinaire traitant ;
4. Vacciner vos chevaux selon le protocole recommandé :
  - a) **Primo-vaccination par 2 injections à 1 mois d'intervalle**
  - b) **Rappel à 6 mois si possible**
  - c) **Rappels annuels**

Aussi, la primo-vaccination doit être complète avant tout déplacement du cheval de l'écurie.

La vaccination est obligatoire pour les étalons et poulinières. Comme, elle est fortement recommandée pour les chevaux de sport.

Les services de l'ONSSA exigent la vaccination contre la rhinopneumonie à tous les chevaux entrant de l'Europe.

